

TOREADOR

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO

Tipo di formulazione: Concentrato solubile
DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRE PERMANENTI

TOREADOR

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13477 del 31/07/2009

COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro g 17,1 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270

Non mangiare, né bere, né

fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ASCENZA ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 84944669

Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - PT

Taglia: 10-20-25-50-100-200-250-500 ml; 1-5-10 l

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre permanenti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Insetticida fogliare sistemico particolarmente adatto ad essere impiegato per il controllo di "insetti chiave" come afidi e aleurodidi.

Possiede lunga durata d'azione dovuta alla sua spiccata sistemicità acropeta, perciò risulta indicato soprattutto per trattamenti precoci.

Agisce principalmente per ingestione ed è efficace nei confronti di fitofagi ad apparato boccale pungente-succhiatore (anche vettori di virus) e ad apparato boccale masticatore. E' un prodotto ideale per programmi di difesa integrata.

Viene impiegato su:

Cocomero, melone (in serra): contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphum euphorbiae*, *Myzus persicae*, *Aulacorthum solani*): 0,05% (50 ml/100 l d'acqua). Contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). **Le colture trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino alla conclusione del raccolto.**

Floreali e ornamentali (in serra): contro afidi (*Aphis gossypii*, *Macrosiphonella chrysanthemi*, *Macrosiphum rosae*) e Metcalfa pruinoso: 0,05% (50 ml/100 l d'acqua), contro aleurodidi (es. *Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*): 0,075% (75 ml/100 l d'acqua). Su floreali e ornamentali in vaso è possibile anche il trattamento per irrigazione. Operare mettendo in sospensione 0,5-1 ml di prodotto per litro di acqua e impiegare questa sospensione distribuendo il quantitativo normalmente utilizzato per irrigare le piante. **Le piante trattate in serra non possono essere poste all'esterno fino a conclusione della fioritura.**

Avvertenze agronomiche Il prodotto contiene una sostanza altamente tossica per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare nei 10 giorni precedenti la fioritura e durante la fioritura. Prima dell'applicazione del prodotto sfalcare o eliminare le piante spontanee in fioritura o prossime alla fioritura, possibilmente anche nelle immediate vicinanze della coltura.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti prima della raccolta osservando i seguenti intervalli: 7 giorni per cocomero, melone
ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO
ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME
VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO ESSERE
RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

TOREADOR

INSETTICIDA - AFICIDA SISTEMICO

**Tipo di formulazione: Concentrato solubile
DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRE PERMANENTI**

TOREADOR

Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali n. 13477 del 31/07/2009

COMPOSIZIONE


Imidacloprid puro g 17,1 (= 200 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H411 Tossico per gli
organismi acquatici con
effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi
per la salute umana e per
l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla
portata dei bambini. P270
Non mangiare, né bere, né
fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione
nazionale.



ASCENZA ITALIA S.r.l.

Via Varese 25/G - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 84944669

Stabilimento di Produzione: ASCENZA AGRO
S.A., Herdade das Praias - 2910-440 Setúbal - PT
Taglia: 10-20-25-50-100-200-250-500 ml; 1-5-10 l

Partita n.: vedi corpo della confezione